

Ein Fall von Empyem.

Heilung durch Operation.

Inaugural-Dissertation

zur

Erlangung der Doctorwürde

unter dem Präsidium

des Herrn Professor

Dr. Ritter von Nussbaum

k. b. Generalstabsarzt à l. s. etc.

der

medizinischen Fakultät München

vorgelegt von

Dietrich Brinkmann,

pract. Arzte in Salzdeshelden Prov. Hannover.

München, 1882.

Kgl. Hof- und Universitäts-Buchdruckerei von Dr. C. Wolf & Sohn.

Ein Fall von Empyem.

Heilung durch Operation.

Inaugural-Dissertation

zur

Erlangung der Doctorwürde

unter dem Präsidium

des Herrn Professor

Dr. Ritter von Nussbaum

k. b. Generalstabsarzt à l. s. etc.

der

medizinischen Fakultät München

vorgelegt von

Dietrich Brinkmann,

pract. Ärzte in Salzdeshelden Prov. Hannover.

München, 1882.

Kgl. Hof- und Universitäts-Buchdruckerei von Dr. C. Wolf & Sohn.



Digitized by the Internet Archive
in 2026

Pleuritische Exsudate kommen im Vergleich zu anderen Krankheiten in der ärztlichen Praxis ziemlich häufig vor. Die größte Zahl derselben ist seröser Natur, und findet auch bei geeigneter Behandlung gewöhnlich eine schnelle Resorption des Exsudates statt. Manchmal jedoch gelingt es nicht trotz aller Vorichtsmafsregeln eine Aufsaugung des Exsudates zu bewirken, im Gegentheil vermehrt sich daselbe, und der Kranke wird von Tag zu Tag elender, er ist nicht mehr im Stande aufrecht zu sitzen, die Athemnoth wird gröfser, und er mufs, um sich etwas Erleichterung zu verschaffen, dauernd auf der kranken Seite liegen. Wenn nun auch primäre Pleuritiden nicht so häufig in die eitrige Form übergehen, so geschieht das aber um so häufiger bei den secundären Formen, bei solchen also, welche nach einer schweren Infectiouskrankheit: Typhus, Pneumonie u. f. w. entstehen.¹⁾ In den letzten Jahren nun sind viele therapeutische Mittheilungen in allen Zeitschriften über die Behandlung des eitrigen pleuritischen Exsudates, des Empyems, gemacht worden, und haben die einen die Behandlung derselben mittelst der Punction, die andern mittelst der Operation durch Eröffnung der Brusthöhle mit Schnitt nebst Ausspülung des kranken Thorax mit einer antiseptischen Flüssigkeit unter antiseptischen Cautelen empfohlen. Letzteres Verfahren hat bis jetzt die meisten Anhänger gefunden, besonders da hervorragende Männer wie König²⁾, Wagner³⁾ und andere sie sehr befürworteten. Es sind daher therapeutische Mittheilungen in der Literatur sehr zahlreich, und es dürfte schwer sein, neue Vorschläge für die Behandlung des Empyems zu machen. Trotz des reichen

¹⁾ F. v. Niemeyer. Lehrbuch der speciellen Pathologie und Therapie. S. 282.

²⁾ Berliner klinische Wochenschrift. Jahrgang 1878, Nr. 25 und 43.

³⁾ ibidem Jahrgang 1840. Nr. 36.

Materials auf diesem Gebiete ist aber doch jede neue Beobachtung und Mittheilung auf demselben von Werth, denn wenn sie auch nicht geeignet ist, neue Gesichtspunkte für die Diagnose und Therapie des Empyems beizubringen, so kann sie doch dazu dienen auch andere zu diesem Verfahren zu er-muthigen, und daher mag die Mittheilung des folgenden Falles schwerer Empyemerkrankung und der dabei gemachten Beobachtung als ein Versuch aufgefaßt werden, zu dem vorhandenen Material etwas beizutragen. Den mitgetheilten Fall habe ich in der ersten Zeit meiner ärztlichen Thätigkeit in Salzdeshelden zu beobachten Gelegenheit gehabt, und hat der glückliche Verlauf desselben mich sehr befriedigt.

Marie Rode, 4 Jahre alt, Tochter eines Steinarbeiters in Salzdeshelden, kam in meine Behandlung am 2. April dieses Jahres. Die Eltern theilten mit, daß das Kind schon längere Zeit mürrisch und krank gewesen sei und viel gehustet habe. Sie hätten den Husten im Anfang für nicht bedenklich gehalten, und der Vater habe sogar das Kind vor ungefähr vier-zehn Tagen wegen seines mürrischen Wesens hart bestraft. Seit dieser Zeit sei das Kind aber bettlägerig geworden, sei nicht mehr im Stande ohne starke Athemnoth und heftigen Husten aufrecht zu sitzen, fiebere häufig sehr stark und nehme immer die rechte Seitenlage ein.

Status praesens: Bleiches, sonst ziemlich kräftig gebautes Mädchen, klagt über Kurzathmigkeit, starken Husten beim Sichaufrichten, vielen Durst und Appetitlosigkeit. Gesichtsfarbe blaß; matter Blick; das Mädchen nimmt die rechte Seitenlage ein. Die Intercostalräume rechts stark vorgetrieben, bei der Athmung unbeweglich. Gerade unter der mamma ist die Haut etwas conisch vorgetrieben und Fluctuation deutlich zu fühlen, Der Herzstoß ist außerhalb der linken Papillarlinie deutlich zu fühlen und zu sehen. Die musc. sterno-cleido-mastoidei scaleni und platysma stark gespannt. Rechte Seite von dem Schlüsselbein an völlig gedämpft.

Die Dämpfung reicht links über das Brustbein hinaus, daher auch die Herzdämpfung nach links verschoben. Die Leberdämpfung ragt gut zwei Finger breit über den untern Rippen-

bogen hervor. Rechte Seite hinten von der spina scapulae an völlig gedämpft. Der Pectoralfremitus auf der ganzen Brusthälfte aufgehoben. Die Auscultation ergibt rechts oben Bronchialathmen, das dann weiter bis zur spina scapulae schwächer wird und von da ab ganz verschwindet. Temperatur 38,4. Puls 132. Respiration 36. Die Diagnose wurde sofort auf ein eitriges, pleuritiches Exsudat gestellt und dieselbe durch eine Probepunction mit der Pravaz'schen Spritze, nachdem ich die Nadel gehörig desinficirt hatte, bestätigt. Es zeigte sich ein weißlich gelber, geruchloser Eiter.

Ohne Zweifel hatte ich also ein Empyem vor mir und zwar eins von der größten Ausdehnung. Es fragte sich nun, ob ich sofort operiren sollte, folgend dem Grundsatz: „Das Empyem ist ein Abscess und muß als solcher behandelt werden,“ oder ob ich nicht erst noch einen Versuch machen sollte mit der Paracentese des Thorax, indem ich mit Hülfe des Potain'schen Aspirationsapparates einen großen Theil des eitrigen Exsudates entleerte. Beim ersteren Verfahren hätte ich eine Resection eines Theiles der Rippe machen müssen, um den großen Abscess völlig zu entleeren, beim letzteren konnte womöglich eine Heilung erzielt werden ohne Eröffnung des Thorax. Außerdem waren mir die günstig verlaufenen und gerade so behandelten Fälle aus der v. Ziemssen'schen Klinik noch frisch im Gedächtnisse. Ebenso ermuthigten die von Professor Baelz und dessen Assistenten Kashimura veröffentlichten Fälle, welche vermittelt des Aspirationsverfahrens Heilung erzielt hatten sogar bei sehr großen Abscessen, auch zu dem aspiratorischen Verfahren.

Professor Baelz sagt in seiner Arbeit¹⁾ Folgendes: „Der an und für sich zweifellos richtige Satz: das Empyem ist ein Abscess und muß als solcher behandelt werden, ist, in dieser Allgemeinheit hingestellt, gefährlich und kann den messerfrohen Praktiker zu den beklagenswertheften Uebereilungen führen. Freilich ist das Empyem ein Abscess, aber ein Abscess sui generis, ein Abscess der serösen Häute.“

Und an einer anderen Stelle ebendasselbst: „Der Arzt

¹⁾ Berliner klinische Wochenschrift. Jahrgang 1880. Nr 31.

mufs sich stets eine gewisse Reserve auferlegen, wenn er vor einem nicht jauchigen Empyem, namentlich dem eines Kindes, steht, und er soll sich wohl befinden, ehe er der unwillkürlichen Bewegung der Hand, zum Messer zu greifen, nachgiebt. (Davon, dafs eine gewisse Uebung zur erfolgreichen Antisepsis gehört, will ich weiter gar nicht reden.) Einer etwaigen *indicatio vitalis* genügt die Punction allemal, und die weitere Beobachtung mag denn über weitere nothwendige Mafsregeln entscheiden.“

Dieses Alles erwägend und bedenkend schlug ich den Eltern die Punction vor, erklärte ihnen aber sogleich, wenn die Ausaugung des Eiters nichts nützen würde, wäre ich gezwungen bei etwaiger Wiederansammlung desselben die Eröffnung des Thorax mittelst des Messers zu machen. Die Eltern gaben erst nach einigem Zögern zu dem angegebenen Verfahren ihre Zustimmung, wie denn die Furcht vor allen Operationen, seien es kleine oder grofse, auf dem Lande eine ziemlich bedeutende ist. Die Aufsaugung des Empyems wurde, da ich den Potain'schen Apparat nicht gleich zur Hand hatte, auf den folgenden Tag festgesetzt, also auf den 3. April.

Die Stelle wo ich punctirte, wurde gehörig mit Seife, Bürste und Aether gereinigt und dann mit Carbolwasser abgewaschen. Die Kanüle nebst Troicart hatte die Nacht hindurch in $2\frac{1}{2}\%$ Carbolwasser gelegen. Bei der nun folgenden Punction entleerten sich etwa 1250 Ccm. Eiter. Das Kind athmete alsbald nach der Operation leichter und wurde ruhiger.

Abends, als ich Patientin nochmals besuchte, war die Temperatur heruntergegangen auf 37,8; Puls 110. Rechts oben am Schlüsselbein ein sonorer Lungenschall, ein Zeichen, dafs die Lunge anfang, sich wieder auszudehnen. Von der zweiten Rippe an war tympanitischer Schall, dann Dämpfung. Das Kind war den Tag über ziemlich wohl und munter gewesen und hatte auch etwas gegessen.

4. April. Abends. Lungenschall bis zur dritten Rippe, dann Dämpfung. Die Lunge hatte sich also wieder weiter ausgedehnt. Herzspitze etwas mehr nach rechts verschoben. Die Auscultation ergibt oben noch reichliches Rasseln. Temperatur 37,7. Puls 108. Das Befinden des Kindes war den Tag über ein leidliches gewesen.

5. April. Abends. Die Percussion giebt dasselbe Resultat wie gestern. Resorption hatte also von der Pleura her nicht stattgefunden. Temperatur 38,2. Puls 124. Auscultation wie gestern. Das Kind war den Tag über ziemlich unruhig gewesen.

Die Zunahme der Temperatur, sowie die Nichtabnahme des Exsudates machten mich besorgt, daß sich das Exsudat nicht auffaugen würde. Diese meine Besorgniß verhehlte ich den Eltern nicht.

Am 6. April war eingetreten, was ich befürchtet hatte. Das Exsudat hatte sich vermehrt. Nur an der clavicula war noch Lungenschall, von da ab Dämpfung. Herzspitze wieder über die Mammillarlinie hinaus nach links verschoben. Temperatur 38,4; Puls 136; Respiration 36. Das Kind hatte den Tag über viel geweint und auch keine Nahrung zu sich genommen.

In Folge dieses mißlichen Befundes nun erklärte ich den Eltern, daß ich jetzt nur noch Heilung durch den Schnitt erzielen könnte. Nach einigem Zögern gaben sie schließlich ihre Einwilligung zur Operation. Dieselbe setzte ich auf den folgenden Tag fest, also auf den 7. April. Verordnung bis dahin: Gründliche Reinigung des Kindes und Ueberschläge von 2¹/₂% Carbolwasser über die rechte Brusthälfte.

7. April. Tag der Operation. Die Operation verlief ganz günstig. Die Chloroformnarcose war gut. Der Schnitt wurde in der Axillarlinie auf die fünfte Rippe gemacht in einer Länge von 4 Ctm., die Rippe vom Periost entblößt, und es gelang, die Rippe ohne Zerreißen des Pleuragewebes zu reseciren. Alsdann wurde die Pleura eröffnet und der Eiter nach und nach abgelassen. Da sich der Eiter beim Einstich im Strahl entleerte, so suchte ich die zu rasche Entleerung desselben durch einen aufgelegten Carbolschwamm zu verzögern, um keine Hämorrhagien aus den so plötzlich vom Druck befreiten Blutgefäßen zu haben. Das Alles geschah natürlich unter Spray. Jedoch benützte ich zu dem Spray keine Carbonsäurelösung sondern eine 1¹/₃% Lösung Salicylwasser, da Kinder bekanntlich gegen die Carbonsäure wenig widerstandsfähig sind, und man durch die Salicylsäure in dieser Form angewandt

keine Intoxication zu befürchten hat. Ebenso wurde die Pleurahöhle mit $\frac{1}{3}\%$ Salicylwasser so lange ausgespült, bis kein Eiter sich mehr zeigte. Eine vollständige Entleerung des Eiters aus den unterhalb der 5. Rippe gelegenen Theilen gelang sehr gut nach dem in der Göttinger Klinik geübten Verfahren:

Man hebt nämlich das Kind an den Beinen etwas in die Höhe und treibt auf diese Weise den Eiter nach der Schnittöffnung. Alsdann wurde, als das Salicylwasser klar abfloß, ein ziemlich dickes Drainagerohr eingelegt und der Lister'sche Verband angelegt. Das Kind war unterdessen aus der Chloroformnarcose erwacht. Erbrechen nach derselben fand nicht statt. Es wurde auf die rechte Seite gelagert, um so dem noch etwa nachrückenden Eiter einen bequemen Abfluß zu verschaffen. Nach der Operation ließ ich dem Kinde, das stark anämisch war, von Zeit zu Zeit einige Theelöffel voll Tokayer Weines reichen, um einem etwa eintretenden Collapszustande vorzubeugen. Es war bei der Operation, die ungefähr $\frac{3}{4}$ Stunde in Anspruch nahm, da mit der Ausspülung des Pleuraraumes viel Zeit verloren ging, gegen $1\frac{1}{2}$ Liter Eiter, der übrigens ganz geruchlos war, entleert worden, gewiß für einen kindlichen Thorax eine recht beträchtliche Menge.

7. April. Abends: Befinden des Kindes gut. Temperatur 37,6. Patientin hatte nach meiner Entfernung ungefähr zwei Stunden geschlafen. Husten war den Tag über wenig gewesen; keine Klagen über Schmerzen waren laut geworden. Diät: Milch, Kalbfleischbouillon und zeitweilig verdünnten Tokayer-Wein.

8. April: Erneuerung des Verbandes. Der Eiter vollständig geruchlos. Das Allgemeinbefinden gut. Temperatur nicht erhöht. Pat. nimmt mit Behagen die ihr dargebotenen Speisen und Getränke.

9. April. Temperatur 37,6. Puls 80. Befinden und Appetit gut. Verband erneuert.

10. April. Erneuerung des Verbandes. Die Lunge hat sich bis zur 6. Rippe wieder ausgedehnt. Die Wunde sondert einen mäßig gelben geruchlosen Eiter ab. Die Wunde selbst ohne irgend welche Reaction. Befinden ausgezeichnet.

11. April. Verband nicht durchnäfst. Temperatur 37,4. Puls 80. Allgemeinbefinden gut.

12. April. Erneuerung des Verbandes. Das Secret der Wunde ist mäfsig. Von jetzt ab wurde der Verband erst jeden 4. Tag erneuert. Bis zum 20. April hatte sich die Lunge vollständig wieder ausgedehnt. Der Husten war fast ganz verschwunden. Die Percussion ergab auf den oberen Particen sonoren Lungenschall; auscultatorisch waren keine Reibe- und Rasselgeräusche mehr zu hören. Die untere Lungenpartie war noch mäfsig gedämpft; auch hörte man noch einzelne pleuritische Reibegeräusche. Aus der Schnittöffnung sondert sich noch ein mäfsiger, geruchloser Eiter ab. Weglassung des Drainagerohres. Das Körpergewicht der Pat. besserte sich von Tag zu Tag und das Aussehen wurde immer blühender und frischer. Nach acht Tagen war die Wunde bis auf eine kleine Oeffnung, aus der sich auf Druck noch ein wenig Secret entleerte, geschlossen. Bei der Percussion war auf der ganzen Thoraxhälfte sonorer Lungenschall. Bei der Auscultation war nur vesiculäres Athmen zu hören und nur an dem untern Lungenrand in der Nähe der Wunde waren noch einzelne Reibegeräusche bemerkbar. Bei Wiederabnahme des Verbandes am 5. Mai hatte die Wunde sich vollständig geschlossen. Ueberall war Vesiculärathmen zu hören, von Reibegeräuschen keine Spur mehr. Der Thorax nirgends eingefunken, auch da nicht, wo das kleine resecirte Rippenstück fehlte. Das Aussehen des Kindes war blühend. Es konnte also als vollständig geheilt aus der Behandlung entlassen werden.

Werfen wir nun einen Rückblick auf unsern Fall, so sehen wir, dafs wir durch die Punktion des Empyems zwar einen grossen Theil des eitrigen Inhaltes entleeren konnten, aber keine dauernde Heilung erzielten. Schon nach zwei Tagen war das eitrig-Exsudat wieder bis zu seiner vorigen Höhe angestiegen, mit seinen Begleiterscheinungen, mit Fieber, Dyspnoe u. s. w.

Der Erfolg war also nur ein vorübergehender. Wir sehen uns also gezwungen, zum Messer unsere Zuflucht zu nehmen und durch einen ausgiebigen Schnitt nebst Resektion eines

Rippentheiles vollständige Entleerung des Eiters und dadurch auch, da dem Eiter ein freier Abfluß gebahnt war, in verhältnißmäßig kurzer Zeit Heilung herbeizuführen. Es spricht also auch unser Fall sehr für die Behandlung des Empyems durch die Schnitteration. Die Punction ist zwar leichter auszuführen, jedoch ist bei Beobachtung der gewöhnlichen Verhaltungsmafsregeln und unter genauer Beobachtung der Antiseptik das Verfahren der Schnitteration nicht viel schwieriger und auch nicht gefahrvoller. Denn vor allen Dingen kommt es darauf an, dafs man den Eiter so vollständig als möglich entleert, und das gelingt durch die Punction gar nicht. Denn wenn man auch durch Zutromenlassen antiseptischer Flüssigkeit den Eiter soviel als möglich zu verdünnen sucht, so wird man ihn doch in den seltensten Fällen vollständig entleeren können, da aus den tiefer gelegenen Sinnesräumen der Eiter sehr schwer austritt.

Wir konnten das auch ganz gut bei unfrem Fall beobachten. Denn trotzdem ich die Pleurahohle mit Salicylwasser sehr genau ausspülte, dafs die Flüssigkeit klar abzufliefsen schien, so sickerte doch gleich hinterher wieder Eiter nach, und es gelang mir nur dadurch denselben vollständig zu entleeren, dafs ich das Kind an den Beinen in die Höhe hob und so den Eiter nach der Ausgangsöffnung trieb.

Auch Lichtheim¹⁾ verwirft die Punction. Er sagt: „Die Punction unter Luftabschluß erfüllt insofern unsere Absichten nicht, als es niemals gelingt durch sie den Eiter auch nur annähernd zu entleeren und das ist die Aufgabe, die wir uns durchaus stellen müssen. Einen wie geringen Theil der gesammten Flüssigkeitsmenge die Punction mit Luftabschluß entfernt, sieht man, wenn man unmittelbar auf sie die Schnitteration folgen läfst.“ In gleicher Weise kam Wagner²⁾ mit der antiseptischen Punction nicht zum Ziele. Derselbe punktirte und spalte fünfmal die Pleurahohle aus, aber stets sammelte sich das Exsudat wieder an, so dafs er schliesslich

Volkmanu. Sammlung klinischer Vorträge Nr. 43. Ueber die operative Behandlung pleuritischer Exsudate von L. Lichtheim.

² l. c.

doch zur Operation mit dem Messer schreiten mußte. Nicht besser erging es ihm bei einem vierjährigen Kinde. Jedoch machte er hierbei nur einmal die Punction. Als dann in einigen Tagen das Exsudat wieder so groß geworden war wie vorher, machte er gleich die Schnittooperation und erzielte dadurch in 3 Wochen Heilung. Auch Goeschel in Nürnberg ¹⁾ erzielte in mehreren Fällen Heilung durch die Schnittooperation und fogar, ohne daß er dieselben antiseptisch behandelte. In gleicher Weise brachten Baum, König ²⁾ ihren Patienten Heilung durch die Operation. Mügge ³⁾ erwähnt in seinen Mittheilungen aus der Göttinger chirurgischen Klinik ebenfalls dreier Fälle, wo nach erfolgloser Punction die Operation durch den Schnitt gemacht werden mußte. Bei dem ersten Fall machte Prof. Rosenbach zuerst, da Lebensgefahr vorhanden war, und der Patient sich noch außerhalb des Spitals befand, die Punction und entleerte 1900 Ccm. Eiter. Zwei Tage war das Befinden des Patienten ziemlich gut, dann nahm die Dämpfung immer mehr und mehr zu. Als die Cyanose wieder hochgradig geworden war, wurde der Patient ins Spital aufgenommen und die Operation vollführt. Es wurde der Thorax eröffnet durch Resection der 8. Rippe etwas nach hinten von der Axillarlinie. Es flossen 1300 Ccm. wenig riechenden Eiters ab. Nachdem auch hier durch Erheben der Beine möglichst der letzte Rest zum Abfluß gebracht war, wurde ein dicker Drain eingeführt und ein Lister'scher Verband angelegt. Patient ging aber später an Thrombose der ven. jug. sinistr. et axillar. zu Grunde.

Beim zweiten Falle war schon vorher 3 mal die Punction gemacht worden, ohne daß es zur Heilung gekommen wäre. Bei dem schon stark heruntergekommenen Patienten wurde die Resection der 6. Rippe in der Axillarlinie mit nachfolgender Eröffnung der Pleurahöhle gemacht. Es entleerten sich ungefähr 2000 Ccm. geruchlosen Eiters. Nach möglichst vollständiger Entleerung durch Erheben der unteren Körperhälfte

¹⁾ Berliner klinische Wochenschrift, Jahrgang 1880. Nr. 36.

²⁾ l. c.

³⁾ Berliner klinische Wochenschrift, Jahrgang 1881. Nr. 11 und 12.

wurde mit Salicylwasser ausgespült, drainirt und ein Lister'scher Verband angelegt. Pat. wurde auf die linke Seite gelagert, um möglichst günstige Ausflussbedingungen zu schaffen; dieselben wurden täglich durch Hochheben des Beckens vermehrt. Der Verlauf war ein dauernd günstiger, und Pat. reifte mit blühendem Aussehen ab.

Der dritte Fall betrifft eine Patientin, bei welcher das Empyem von selbst zum Durchbruch gekommen war. Die Natur hatte also selbst eine Punction vorgenommen ohne aber, daß es zur Heilung gekommen wäre, denn aus drei Fisteln entleerte sich mühsam Eiter und Pat. erholte sich nicht. Es wurde daher auch hier die Schnittoperation durch Resection der 5. Rippe in der Axillarlinie links gemacht und 600 Ccm. eines etwas stinkenden Eiters entleert. Der Thorax wurde dann mit Salicylwasser mit Chlorzinklösung ausgespült und desinficirt. Die Desinfection mußte öfters wiederholt werden, da der Eiter sich zersetzte, und als dieser geruchlos geworden war, erholte sich Pat. sehr rasch und konnte bald als geheilt entlassen werden.

Sodann mußte auch Hüpeden¹⁾ bei einem vierjährigen Knaben, um ein eitriges pleuritiches Exsudat zur Heilung zu bringen, die Resection eines Rippenstückes machen, welche auch bald zur Heilung führte.

In den Verhandlungen der Berliner medicin. Gesellschaft vom 19. Januar 1881²⁾ sprechen sich die meisten Redner, so unter Anderen Guttmann, Baginsky, Settegast für die Behandlung des Empyems mittelst der Schnittoperation aus, wenn auch, wie Lichtheim, ohne Resection eines Rippenstückes. Namentlich genügte der einfache Brustschnitt mit Einführung eines größeren Drainrohres bei Kindern. Die besten Resultate wurden erzielt, wenn streng nach Lister verfahren wurde. Doch wird man in vielen Fällen gezwungen sein, die Resection zu machen, besonders wenn es sich um Exsudate handelt, bei denen der Eiter sich schon zersetzt hat und stinkend geworden ist. Man muß dann ja häufiger die Brust-

¹⁾ Bericht der Hannover'schen Kinderheilanstalt im Jahre 1881.

²⁾ Berliner klinische Wochenschrift Nr. 19. und 20. Jahrgang 1881.

höhle aseptisch ausspülen, und es eignet sich dafür eine grössere Oeffnung besser.

Ich selbst habe während dieser Zeit noch einmal Gelegenheit gehabt, die Empyemoperation zu machen. Es betraf dieselbe ein 5 jähriges Mädchen, Namens Johanne Müller aus Rittierode. Dieselbe war im Anfang Mai am heftigen Husten erkrankt. Die Eltern des Kindes hatten im Anfang die Krankheit weniger beachtet, da zu derselben Zeit viele Kinder an Keuchhusten litten. Als jedoch heftige Durchfälle und Fiebererscheinungen die Kräfte des Kindes zu consumiren drohten, schickten dieselben zu mir. Ich constatirte einen grossen linksseitigen Pleuracrguss. Die Dämpfung verbreitete sich über die ganze Thoraxhälfte. Athmungsgeräusch war fast ganz verschwunden. Puls 140; Respiration 38; Temperatur 38,7. Das Kind war sehr anämisch und abgemagert. Die Probepunction mit der Prevaz'schen Spritze ergab einen gelblich-weisen Eiter.

Ich machte am 27. Mai die Schnittoperation, indem ich die Brusthöhle in der Arillarlinie links zwischen der 6. und 7. Rippe eröffnete. Die Oeffnung machte ich 4 ctm. lang. Es entleerte sich ein gelblicher, geruchloser Eiter, ungefähr 1100 Ccm. Dann wurde die Pleurahöhle wiederholt mit $\frac{1}{3}\%$ Salicylwasserlösung ausgespült, der Eiter möglichst durch Erheben an den Beinen ausgeleert, ein dickes Drainrohr eingeführt, der Lister'sche Verband angelegt und Pat. auf die linke Seite gelagert, um dem Eiter einen bequemen Abfluss zu verschaffen. In der ersten Zeit wurde der Verband täglich erneuert, da das Secret ein sehr reichliches war. Später konnte er längere Zeit liegen bleiben. Das Fieber und die Durchfälle waren seit der Operation ganz verschwunden. Der Appetit kehrte zurück, und die Heilung war ohne jeden Zwischenfall nach 6 Wochen vollendet.

Diese Operation verlief also auch mit dem günstigsten Erfolge, und auch hier bestätigte sich wieder der Satz: „das Empyem ist ein Abscess und muss als solcher behandelt werden.“ Darum stimmen auch wir den Ausführungen Lichtheims und Anderer bei, dass die Schnittoperation, wenn anders

dieselbe unter antiseptischen Cautelen sorgfältig ausgeführt wird, die denkbar unschuldigste Operation, nicht gefährlicher als die Punction ist und die günstigsten Resultate liefert. Der Erfolg der Schnittoperation übertrifft aber den der Punction, da sich bei letzterer der Erguß häufig wieder ansammelt, und man zuletzt doch gezwungen ist, die erstere Operation zu machen. Die Schnittoperation liefert aber jedes Mal, da hier das Secret fortwährend abfließen kann, rasche Heilung.

Zum Schlusse erlaube ich mir, meinem hochverehrten Lehrer, Herrn Generalstabsarzt Prof. Dr. Ritter von Nussbaum, der gütigst das Referat über diese Arbeit übernommen hat, an dieser Stelle meinen tiefgefühltesten Dank auszusprechen.
